

Portal Województwa Lubuskiego



Szczepienia przeciw COVID-19. Rusza rejestracja kolejnych grup



Kategoria - Koronawirus

Data publikacji -10 marca 2021 godz. 11:37

Ruszyła rejestracja kolejnej grupy osób chcących zaszczepić się przeciwko COVID-19. Obecnie mogą to robić osoby w wieku od 65 do 69 lat, a także pacjenci przewlekle chorzy. Wkrótce ruszy też rejestracja dla służb mundurowych.

Według założeń do końca marca br. w Polsce ma zostać zaszczepionych 3 mln osób, a 3,5 mln ma być zaszczepionych pierwszą dawką.

Kto i kiedy może zapisać się na szczepienie?. Ważne terminy w marcu 2021 r.

W marcu rozpoczął się **kolejny etap szczepień przeciw COVID-19**. Rejestrować się mogą osoby od 65. roku życia, pacjenci z chorobami przewlekłymi oraz przedstawiciele służb mundurowych. Poniżej publikujemy ważne terminy.

- 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekłe;
- 11 marca – rusza rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat.
- 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekłe;
- 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;
- 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

WAŻNE! Ponieważ uprawnionych do szczepień w grupie wiekowej **od 65 do 69 lat** są ponad 3 miliony osób, obowiązuje następujący harmonogram rejestracji:

- 11 - 13 marca - rocznik 1952
- 18 - 20 marca - rocznik 1952 - 1954
- 22 - 24 marca - rocznik 1952 - 1956
- 25 - 27 marca - Grupa 70+

Warto zaznaczyć, że osoby, które nie zarejestrują się we wskazanym terminie, będą to mogły zrobić również później. Powyższy harmonogram został stworzony jedynie po to, aby zmniejszyć liczbę osób, które w danym czasie zgłaszają się do zapisów, a tym samym zredukować tworzenie się kolejek.

Kolejność szczepień osób przewlekłe chorych

Szczepienie osób z chorobami przewlekłymi rusza 15 marca. Aby ten proces przeprowadzić sprawnie, wyznaczono kolejność szczepień. Chorzy dostaną skierowanie automatycznie, jednak w niektórych przypadkach zalecana będzie konsultacja z lekarzem prowadzącym – czy na pewno kwalifikują się na szczepienie i w jakim terminie.

Na początku szczepionkę będą mogli przyjąć:

- pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek;
- pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dni 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią;
- pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne;
- pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Rada Medyczna rekomenduje, by **szczepieniami** objąć również pacjentów, którym zdiagnozowano **choroby onkologiczne**, a którym jeszcze nie podjęto leczenia, a także pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do przeszczepów.

Skierowania dla tej grupy wystawione będą automatycznie. Pacjenci dializowani będą mogli się zaszczepić w swojej stacji dializ, osoby hospitalizowane – w szpitalach, w których są leczone. Uprawnieni będą mogli także skorzystać ze szczepień w szpitalach węzłowych lub w wybranym przez siebie punkcie populacyjnym.

Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, mają zostać udostępnione również mobilne zespoły szczepiące, które przyjadą na miejsce. O kwalifikacji do szczepień zdecydują lekarze prowadzący oraz medycy tuż przed podaniem samej szczepionki.

Ważne! Szczepionka gwarantuje bezpieczeństwo osobie zaszczepionej. Nawet jeśli później zachoruje, to przejdzie tę chorobę dużo łagodniej niż ci, którzy nie przyjęli preparatu.

Nowe zasady szczepień ozdowieńców

Zmieniają się zasady szczepień osób, które już przeszły Covid-19. Zgodnie z zaleceniami Rady Medycznej, ozdowieńcy przyjąć jedną dawkę szczepionki **po 6 miesiącach**, licząc od dnia uzyskania wyniku testu potwierdzającego zakażenie.

Trzy rodzaje szczepionek

Przypomnijmy, że w Polsce obecnie pacjenci szczepieni są preparatami trzech firm Pfizer, Moderna oraz AstraZeneca. Według najnowszych zaleceń druga dawka szczepionki AstraZeneca powinna być podana w okresie 12 tygodni po otrzymaniu przez pacjenta pierwszej dawki. W przypadku szczepionek Pfizer drugą dawkę należy podać w czasie do 42 dni po pierwszym zastrzyku.